

TERAPIA INTRAVESICAL

La terapia intravesical consiste en la instilación de un fármaco a través de un catéter vesical.

Antes de comenzar la instilación, tendrá que orinar en el Hospital de Día para preparar la vejiga.

Estos fármacos pueden ser variados según indicación, los hay de un color intenso que provocarían durante dos o más días que las micciones fueran del mismo color.

Dirección Territorial de Melilla
Hospital Comarcal de Melilla
Hospital de Día

Autoras:

Providencia Trujillo Muñoz
M^ª Dolores Jiménez Lechuga
M^ª Teresa Martín Espinosa
Carmen Yolanda Torres García

2ª edición, 2021


Edita: © Instituto Nacional de Gestión Sanitaria
Subdirección General de Gestión Económica y Recursos Humanos
Servicio de Recursos Documentales y Apoyo Institucional
Alcalá, 56 - 28014 - Madrid

NIPO: 135-21-012-7
DL M 11141-2021
Colección Editorial de Publicaciones de INGESA: 2.098

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:
<https://cpage.mpr.gob.es>

En esta publicación se ha utilizado papel reciclado libre de cloro de acuerdo con los criterios medioambientales de la contratación pública.

Diseño: Komuso
Imprime: Afanías, Gráficas y Manipulados, S.L.U.



RECOMENDACIONES AL PACIENTE EN TRATAMIENTO INTRAVESICAL



PREPARACIÓN ANTES DE PONERSE EL TRATAMIENTO

Desde la noche anterior debería limitar el consumo de líquidos, para que tras la instilación pueda aguantar la micción durante dos horas.



DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

- Después del tratamiento, cuando llegue a casa, debe tumbarse y cambiar de lado cada 15 minutos, para que el fármaco tenga contacto con toda la vejiga.
- Cuando pasen las dos horas y hasta 8 horas después, debe orinar sentado para evitar salpicaduras sobre la piel.
- Beba abundante líquido durante 12 horas después del tratamiento para limpiar bien su vejiga.
- Lave su ropa aparte de la del resto de su casa para evitar que otros sean expuestos al medicamento.
- Use guantes para limpiar el inodoro en caso de que se produzca derrame de orina.

SIGNOS DE ALERTA DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Algunos pacientes desarrollan infección de vejiga tras este procedimiento.

Si usted tiene estos síntomas:

- Quemazón o dolor al orinar
- Urgencia al orinar
- Detecta sangre en la orina
- Fiebre
- Diarrea
- Calambres

CONSULTE CON SU EQUIPO MÉDICO